

Les noms vernaculaires oubliés des *Formicidae*

Par Clément Gouraud.

En France, l'usage de noms vernaculaires est souvent employé pour désigner des espèces emblématiques ou familières. En général, jouissent de noms vernaculaires la faune vertébrée, la flore et quelques ordres d'insectes. Un pareil vocabulaire pour nommer les espèces de *Formicidae* est quasiment absent du dialecte des myrmécologues, des naturalistes et gestionnaires.

Pourtant, des noms vulgaires furent employés pour désigner les espèces de fourmis en France dès le XVIII^{ème} siècle. Jusqu'à nos jours, nous sont communément parvenus dans le langage courant les noms de « fourmi noire des jardins, fourmi jaune des prairies, fourmi rousse, fourmi rouge, fourmi moissonneuse, fourmi charpentière ». En fait, il existe bien d'autres dénominations pouvant paraître parfois obsolètes mais qui méritent tout de même d'être rappelées en tant que patrimoine linguistique à valoriser.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Auteur, date
<i>Aphaenogaster gibbosa</i> (Latreille, 1798)	Fourmi bossue	Latreille, 1798
<i>Aphaenogaster senilis</i> Mayr, 1853	Fourmi gitane	(Langage courant)
<i>Aphaenogaster subterranea</i> (Latreille, 1798)	Fourmi des gazons	Latreille, 1798
<i>Camponotus aethiops</i> (Latreille, 1798)	Fourmi éthiopienne	Latreille, 1798
<i>Camponotus cruentatus</i> (Latreille, 1802)	Fourmi ensanglantée	Latreille, 1802
	Fourmi sanguinaire Fourmi cruelle	(Langage courant)
<i>Camponotus herculeanus</i> (Linné, 1758)	Fourmi hercule	Latreille, 1798
<i>Camponotus lateralis</i> Olivier, 1792	Fourmi bicolore	Latreille, 1798
<i>Camponotus ligniperda</i> (Latreille, 1802)	Fourmi ronge-bois	Latreille, 1798
	Fourmi charpentière	(Langage courant)
<i>Cardiocondyla elegans</i> Emery, 1869	Fourmi des grèves	(Langage courant)
<i>Colobopsis truncata</i> (Spinola, 1808)	Fourmi concierge, fourmi portière	(Langage courant)
<i>Crematogaster scutellaris</i> (Olivier, 1792)	Fourmi scutellaire	Latreille, 1798
<i>Dolichoderus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1771)	Fourmi quadripunctuée	Latreille, 1798
	Fourmi à quatre points	(Langage courant)
<i>Formica cunicularia</i> Latreille, 1798	Fourmi mineuse	Latreille, 1798
<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758	Fourmi noir-cendré	Latreille, 1802 ; Erbrard, 1861
<i>Formica gagates</i> Latreille, 1798	Fourmi jaïet	Latreille, 1798
	Fourmi morio	
<i>Formica picea</i> Nylander, 1846	Fourmi des tourbières	(Langage courant)
<i>Formica polyctena</i> Förster, 1850 et <i>Formica rufa</i> Linnaeus, 1761	Fourmi rousse des bois	(Langage courant)
	Fourmi fauve	Latreille, 1798

<i>Formica pratensis</i> Retzius, 1783	Fourmi des prés	Blanchard , 1875
	Fourmi rousse des prés	Latreille, 1802a
	Fourmi fauve à dos noir	Huber, 1810
<i>Formica rufibarbis</i> Fabricius, 1793	Fourmi à barbe-rousse	Blanchard E. 1875
	Fourmi rufibarbe	Latreille, 1798
	Fourmi mineuse	Erbrard, 1861
<i>Formica sanguinea</i> Latreille, 1798	Fourmi sanguine	Latreille, 1798
<i>Lasius brunneus</i> (Latreille, 1798)	Fourmi brune	Latreille, 1798
<i>Lasius emarginatus</i> (Olivier, 1792)	Fourmi échancrée	Latreille, 1798
<i>Lasius flavus</i> (Fabricius, 1782)	Fourmi jaune	Latreille, 1798, Bellmann, 1999
	Fourmi jaune des prairies	(Langage courant)
<i>Lasius fuliginosus</i> (Latreille, 1798)	Fourmi fuligineuse	Latreille, 1798
	Fourmi noire des Bois	Bellmann, 1999
<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758)	Fourmi noire	Latreille, 1798
	Fourmi noire des jardins	(Langage courant)
<i>Leptothorax acrevorum</i> Fabricius, 1793	Fourmi moncellière	Latreille, 1798
<i>Linepithema humile</i> (Mayr, 1868)	Fourmi d'Argentine	(Langage courant)
<i>Manica rubida</i> (Latreille, 1802)	Fourmi rougeâtre	Latreille, 1802a
	Grande fourmi rouge	André, 1881
<i>Messor</i> Forel, 1890	Fourmi moissonneuse	(Langage courant)
<i>Messor barbarus</i> (Linné, 1767)	Fourmi barbaresque	Latreille, 1802a
<i>Messor capitatus</i> (Latreille, 1798)	Fourmi grosse tête	Latreille, 1798
	Atta noire	Blanchard E. 1875
<i>Messor structor</i> (Latreille, 1798)	Fourmi maçonne	Latreille, 1798
	Atta maçonne	Blanchard E. 1875
<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Fourmi des pharaons	(Langage courant)
<i>Myrmecina graminicola</i> (Latreille, 1802)	Fourmi graminicole	Latreille, 1798
<i>Myrmica</i> Latreille, 1804	Myrmice	Latreille, 1809
<i>Myrmica rubra</i> (Linné, 1758)	Fourmi rouge	Latreille, 1798
<i>Plagiolepis pygmaea</i> (Latreille, 1798)	Fourmi pygmée	Latreille, 1798
<i>Ponera</i> Latreille, 1804	Fourmi étranglée	Latreille, 1802b
	Ponère	Latreille, 1809
<i>Polyergus rufescens</i> (Latreille, 1798)	Fourmi roussâtre	Latreille, 1798 ; Huber, 1810 ;
	Fourmi amazonne	Huber, 1810 ; Erbrard, 1861
	Fourmi légionnaire	Huber, 1810
<i>Solenopsis fugax</i> (Nylander, 1849)	Fourmi esclavagiste	(Langage courant)
	Fourmi fugace	Latreille, 1798
	Fourmi brigande	Bellmann, 1999
	Fourmi voleuse	(Langage courant)
<i>Tapinoma erraticum</i> (Latreille, 1798)	Fourmi errante	Latreille, 1798
<i>Tapinoma melanocephalum</i> (Fabricius, 1793)	Fourmi fantôme	(Langage courant)
<i>Temnothorax tuberum</i> (Fabricius, 1775)	Fourmi tubéreuse	Latreille, 1798
<i>Temnothorax unifasciatus</i> (Latreille, 1798)	Fourmi unifasciée	Latreille, 1798
<i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus, 1758)	Fourmi des gazons	Latreille, 1798

Bibliographie :

ANDRE E. (1881) – Les fourmis - Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie. T2. Beaune. 919 + 48 p.
 BELLMANN, H. (1999) – Guide des abeilles, boudons, guêpes et fourmis d'Europe. Delachaux et Niestlé. 336 p.

BLANCHARD E. (1875) – Les Mœurs des fourmis d'après de récentes recherches. Revue des Deux Mondes (Tome 11). 780-810
 BONDROIT J. (1918) – Les fourmis de France et de Belgique. Annales de la Société entomologique de France, 87 : 1-174.
 DROUIN J.-M. (1987) – Du terrain au laboratoire : Réaumur et l'histoire des fourmis. ASTER : 35-47
 ERBRARD E. (1861) – Nouvelles observations sur les fourmis. Bibliothèque Universelle et revue Suisse - 467 p.
 FOREL A. (1920) – Les fourmis de la Suisse. Edition le Flambeaux. Le Chaux-de-Fond. 336 p.
 HUBER P. (1810) – Recherches sur les mœurs des fourmis indigènes. Edt. Paris et Genève : Paschoud. 328 pages.
 LATREILLE P. A. (1798) – Essai sur l'histoire des fourmis de la France. A Brive, chez F. Bourdeaux, imprimeur : 50 p.
 LATREILLE P. A. (1802a) – Histoire naturelle des fourmis, et recueil de mémoires et d'observations sur les abeilles, les araignées, les faucheurs, et autres insectes. Paris: Impr. Crapelet (chez T. Barrois), xvi. 445 p.
 LATREILLE P. A. (1802b) – Description d'une nouvelle espèce de fourmi. Bull. des Sciences, Société philomatique, Paris, 3: 65-66.
 LATREILLE P. A. (1809) - Genera crustaceorum et insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimis explicata. Tomus 4. Parisiis et Argentorati [= Paris and Strasbourg]: A. Koenig, 399 pp.
 NYLANDER W. (1856) – Synopsis des Formicidés de France et d'Algérie. Annales de la Société d'Histoire naturelle, Zoologie (4) 5 : 51-109.



Une question d'épaules

Afin de distinguer le genre *Tetramorium* et *Myrmecina*, il est souvent question d'épaules « carrées » (photos de la reine à gauche) par différence avec les épaules arrondies d'autres genres (tels que les *Temnothorax* par exemple : ouvrière à droite). Sur les clichés ci-dessous de Bertrand Michel (ADEP), le propos est parfaitement illustré. En positionnant bien le sujet sous la loupe, il est facile de repérer ce détail d'importance quelqu'en soit la caste !

